

ORIENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS INFECTOLOGISTAS DO PLANTÃO DE DÚVIDAS- CORONAVAC

PERGUNTAS FREQUENTES

POSSO TOMAR A VACINA SE?

1- Já tive COVID-19

SIM

2- Estou grávida

NÃO, POR ENQUANTO

3- Pretendo engravidar

NÃO HÁ ESTUDOS

4- Estou amamentando

PROVAVELMENTE SIM, MAS NÃO HÁ ESTUDOS

5- Participei de um estudo de vacina anti-COVID-19

NÃO. ESPERE SER CHAMADO PELO ESTUDO.

6- Vivo com HIV

SIM

7- Tenho asma, DPOC, cirrose, diabetes, pressão alta, cardiopatia, epilepsia, tatuagem

SIM

8- Tratei de câncer

SIM

9- Estou tratando de câncer

SIM

10- Alergia a outras vacinas

SIM, **SE** não se houver alergia a qualquer um dos componentes da vacina (hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio, e hidróxido de sódio).

Se houver dúvida, o respondedor deve contactar o CRIE pelo grupo de Whasapp “Voluntários covid”.

11- Alergia a ovo

SIM

12- Tive febre nas últimas 24 horas (>37,5° C)

NÃO

13- Estou com febre (> 37, 5° C)

NÃO

14- Tive febre há mais de 24 horas

SIM

15- Tomo corticoide

SIM

16- Tomo imunossupressor

SIM

17- Tomo imunobiológico (anticorpos monoclonais)

SIM

18- Sou transplantado/a

SIM

19- Tomei outra vacina contra COVID

NÃO

20- Tomei vacina contra outras doenças

SIM

21- Tenho uma pessoa imunossuprimida/doente em casa ou próxima

SIM

22- Tomo anticoagulante

Esta vacina, assim como todas as vacinas injetáveis, deve ser administrada com precaução em indivíduos com trombocitopenia ou coagulopatias, uma vez que podem ocorrer hemorragias após a aplicação IM nestes pacientes. Colocar gelox no local por 5 minutos após a aplicação, se possível.

23- Sou idoso/a

SIM

24- Tenho uma doença autoimune

SIM

25- Tomo imunoglobulina

SIM

26- Tenho silicone no local de injeção

SIM. Escolha outro local de aplicação

27- Estou tomando antibiótico

SIM

QUANDO SERÁ A PRÓXIMA DOSE?

Esperar ser chamado para a próxima dose.

QUAIS SÃO OS EFEITOS COLATERAIS QUE PODEM OCORRER?

MUITO COMUNS ($\geq 10\%$)

Locais: Dor no local da injeção

Sistêmicos:

Cansaço, fadiga

Dor de cabeça

COMUNS ($\geq 1\%$ a $< 10\%$)

Locais: Edema, prurido, endureção no local da injeção

Sistêmicos:

Náusea

Diarreia

Dor muscular

Tosse.

Dor articular

Coceira na pele

Nariz escorrendo

Dor de garganta

Congestão nasal

INCOMUNS ($< 1\%$)

Locais: hematoma no local da injeção

Sistêmicos:

Vômitos

Febre

Exantema
Dor na orofaringe
Espirros
Tontura
Dor abdominal
Sonolência,
Mal-estar
Rubor
Dor/desconforto nas extremidades
Dor nas costas
Vertigem
Edema
Dispneia
Diminuição de apetite

DESCONHECIDOS:

É uma vacina nova, podem ocorrer efeitos desconhecidos até o momento

FIQUEI COM DOR INTENSA NO LOCAL DA VACINA:

Colocar compressa fria no local e tomar analgésico

ESTOU COM MUITOS EFEITOS COLATERAIS SISTÊMICOS (fora da área de vacinação)

Procurar atendimento no CEAC. No caso de serviços terceirizados, procurar o CRIE

APÓS COMPLETAR A VACINAÇÃO, POSSO PEGAR COVID-19?

Sim. Você deverá continuar a:

- evitar aglomeração,
- manter distanciamento das pessoas,
- evitar ambientes fechados
- usar máscara.

DADOS DE EFICÁCIA DA CORONAVAC



Tabela 2 Eficácia vacinal em 9242 profissionais de saúde em contato direto com pacientes com COVID-19

Grupo de análise	Vacina n = 4653 Pessoas- tempo (100s de anos): 7,24		Placebo n = 4589 Pessoas- tempo (100s de anos): 7,06		Eficácia vacinal (IC95)	P
	Casos	Incidência	Casos	Incidência		
Todos os casos sintomáticos de COVID-19 (Score 2 ou superior)	85	11,74 (9,38 – 14,52)	167	23,64 (20,19 – 27,51)	50,39% (35,26 – 61,98)	0,0049*
Todos os casos sintomáticos de COVID-19 que precisaram assistência ambulatorial ou hospitalar (Score 3 ou superior)	7	0,97 (0,39 – 1,99)	31	4,39 (2,98 – 6,23)	77,96% (49,15 – 90,44)	0,0029*
Todos os casos sintomáticos de COVID-19 que precisaram assistência hospitalar (Score 4 ou superior – Casos moderados e graves)	0	0 (0 – 0,51)	7	0,99 (0,40 – 2,04)	100% (95,42 – 100)	0,4967

* Estatisticamente significante